CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º ..... 037 ...../ 21 .....

Expediente da_____ sessão em____/____/____

DIVERSOS Nº..... - ...../ - .....

ASSUNTO: Contratação de empresa para testes rápidos (covid - 19)

AUTOR: Vereador Anderson Aparecido de Godoi

TREMEMBÉ, 20 **DE** março **DE 20** 21

TERMO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, no uso de suas atribuições legais, determina a abertura de processo de licitação, para com fulcro na Lei nº 13.979/2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, contrate empresa para a elaboração de testes rápidos (antígeno covid19) contra o Covid-19, para que o mesmo seja aplicado quinzenalmente nos colaboradores desta Casa de Leis.

Determina:

a) A abertura de procedimento de dispensa de licitação;

b) Observe-se o limite permitido por dispensa;

c) Oficiar o responsável pela contabilidade para indicação da dotação orçamentária e financeira necessária a compra, tendo como base o valor de 40 testes por mês, a R$ 120,00 cada teste;

d) Após ao Chefe do Setor de Licitações e Compras, para a devida pesquisa de preços e efetiva compra do produto.

e) Por fim, à Procuradoria Jurídica.

Tremembé, 19 de maio de 2021.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
PRESIDENTE

instituto brasileiro de administração municipal

PARECER

Nº 1288/2021[1]

- PL – Poder Legislativo. Medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19. Aquisição de testes para diagnóstico da doença para vereadores e servidores. Considerações.

CONSULTA:

Indaga a consulente, Câmara Municipal, sobre a possibilidade de contratar empresa para aplicação de testes rápidos contra o COVID nos servidores e vereadores mensalmente.

RESPOSTA:

Inicialmente, temos que que a rápida expansão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) impôs sérias restrições ao nosso modo de vida. Como tem sido amplamente divulgado, as estratégias de distanciamento social adotadas pelos Estados e Municípios contribuem, principalmente, para evitar o colapso nos sistemas de saúde locais, salvaguardando, desta forma, vidas.

A Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em seu art. 3º estabelece a possibilidade de adoção de medidas restritivas. Já o § 1º deste mesmo dispositivo estabelece que essas medidas somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Vejamos:

[1]PARECER SOLICITADO POR ANDERSON APARECIDO DE GODOI,PRESIDENTE - VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL (TREMEMBÉ-SP)

"Art. 3º: (...)

§ 1º: As medidas previstas neste artigo **somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço** ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública". (Grifos nossos).

A administração pública do Município tem o poder-dever de zelar pela saúde e bem-estar da coletividade, bem como de assegurar e garantir o respeito dos direitos fundamentais da população. Portanto, a adoção de medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), deverá, sempre, em consonância com o art. 3º da Lei nº 13.979/2020, ter base em evidências científicas e em análises sobre as informações de saúde.

Em cotejo, há de se observar que o administrador público deve sempre estar pautado no postulado da eficiência (relação custo/benefício da medida a ser tomada), segundo o qual, o administrador público deve procurar a solução que melhor atenda ao interesse público, considerando para tanto o ótimo aproveitamento dos recursos públicos.

Dentro do contexto apresentado, é legítimo que, como medida de enfrentamento à pandemia do COVID-19, a Casa Legislativa contrate laboratório para proceder exames, desde que os mesmos sejam eficientes no *mister* de evitar a propagação do contágio de seus colaboradores que mantenham contato com o público, o que inclui, servidores efetivos, comissionados, contratados temporários por excepcional interesse público e também os vereadores.

Em assim sendo, em que pese não existam óbices para que a Casa Legislativa proceda os exames através da contratação de um laboratório, é preciso, à luz do postulado da eficiência, observar e justificar qual exame dentre os atualmente disponibilizados atenderia o caso concreto relacionado.

O teste rápido, por exemplo, é mais eficiente para detectar

anticorpos, sendo mais indicado a sua realização a partir do décimo dia de sintomas. Assim, o teste rápido é mais eficiente para entender melhor como a resposta imune contra o vírus Sars-CoV-2 se desenvolve em pacientes ao longo do tempo do que para detectar indíduos contaminados e possível vetor de contágio. Vejamos o seguinte trecho de notícia veiculada no Portal da ANVISA:

> "Na produção das defesas do organismo, os anticorpos do tipo IgM são os primeiros a aparecer, por isso estão relacionados a infecções recentes, isto é, presentes em pacientes que podem possuir o vírus. Pelo conhecimento que se tem sobre a Covid-19 e pelas limitações relacionadas ao desenvolvimento do teste, não é possível utilizar esta informação isoladamente como diagnóstico, sendo recomendada a confirmação por ensaio molecular, onde é possível identificar a presença ou não do vírus na amostra testada. Ainda não se sabe por quanto tempo os anticorpos IgM e IgG para Covid-19 permanecem no corpo. Portanto, mesmo para os anticorpos do tipo IgG que são produzidos mais tardiamente, a interpretação isolada do resultado não assegura que não haja mais infecção.
>
> Por esse motivo, é importante salientar que o teste rápido não detecta especificamente o novo coronavírus, mas sim os anticorpos produzidos pelo organismo depois de a infecção ter ocorrido.
>
> Embora os testes de anticorpos ainda tenham um valor limitado para o diagnóstico de uma pessoa com suspeita de Covid-19, o uso desse tipo de teste pode ajudar a entender melhor como a resposta imune contra o vírus Sars-CoV-2 se desenvolve em pacientes ao longo do tempo. Apesar de ainda existir muita incerteza com relação a esse novo vírus, também é possível que, com o tempo, o amplo uso desses testes de anticorpos e o acompanhamento clínico dos pacientes forneçam à comunidade médica mais informações sobre recuperação e sobre o risco de infeção pela exposição ao vírus, além de auxiliar na definição de

políticas públicas". (Disponível em: http://http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5855858&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=covid-19-saiba-mais-sobre-testes-rapidos&inheritRedirect=true. Acesso em 20/04/2021).

À guisa de informação, registre-se que o Senado Federal iniciou no início de junho de 2020 exames periódicos (a cada 15 dias) dos colaboradores que lá trabalham presencialmente com o mesmo desiderato revelado pela Câmara consulente. Todavia, o exame adotado no âmbito do Senado Federal foi o RT-PCR para SARS-COV-2, mais conhecido como swab, indicado para detectar se um indivíduo está contaminado. (Informação disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/05/senado-iniciou-nesta-sexta-teste-da-covid-19-para-quem-trabalha-presencialmente. Acesso em: 20/04/2021).

Isto posto, concluímos objetivamente a presente consulta na forma das razões exaradas.

É o parecer, s.m.j.

Rafael Pereira de Sousa
Consultor Técnico

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO http://lam.ibam.org.br/confirma.asp E UTILIZE O CÓDIGO iej0ggefig

HERMES PARDINI Medicina, Saúde e Bem-estar MG

(https://www.hermespardini.com.br/coronavirus/)

O que você procura?

TESTE RÁPIDO ANTÍGENO COVID19

Material: SWAB DE NASOFARINGE

Não está em MG?
Conheça nossas lojas em outros estados:

SÃO PAULO (https://www.hermespardini.com.br/coronavirus-sp/teste-rapido-antigeno) CENTRO DE MEDICINA (RJ) (https://www.centrodemed.com.br/coronavirus/teste-rapido-antigeno)

R$175,00

Tipo Atendimento

Exame habilitado apenas para pagamento particular

PROCEDIMENTO

INDICAÇÃO

PASSO A PASSO

INFORMAÇÕES GERAIS

O Teste Rápido COVID-19 Antígeno deve ser realizado até o 7º dia do início dos sintomas da COVID-19, preferencialmente até o 5º dia, desde que suas restrições sejam conhecidas e os resultados interpretados corretamente por um médico.

Teste realizado por meio de um ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe.

É importante ressaltar que o Teste Rápido COVID-19 Antígeno possui menor sensibilidade do que os testes que detectam ácido nucleico pela técnica de RT-PCR, sendo o RT-PCR considerado o padrão-ouro para diagnóstico de SAR-CoV2.

O teste pode ser realizado nas unidades Hermes Pardini listadas no formulário abaixo ou pelo sistema Drive-Thru da unidade Mangabeiras (Praça da Bandeira, nº 50) e da unidade Pampulha (Av. Pres. Antônio Carlos, nº 7781).

O procedimento é realizado por pro[illegible]ais capacitados, obedecendo à conduta de [illegible]eio estabelecida por protocolos do Ministério da Saúde. Os uniformes e materiais utilizados são especiais e

descartáveis, para atendimento com total segurança.

O resultado do Teste Rápido COVID-19 Antígeno é liberado 30 minutos após a coleta.

O Teste Rápido COVID-19 Antígeno é realizado apenas na modalidade particular.

Receba nossas

NOVIDADES

Nome | E-mail | INSCREVER-SE

Reafirmando nosso compromisso com a saúde pública, disponibilizamos o teste para detecção do novo Coronavírus (COVID-19) em domicílio.

Hermes Pardini. Confiança faz bem pra saúde.

Teste Covid-19 em MG (https://www.hermespardini.com.br/coronavirus)

Teste Covid-19 em SP (https://www.hermespardini.com.br/coronavirus-sp)

Teste Covid-19 no RJ (https://centrodemed.com.br/coronavirus/)

Política de Compra (https://www.hermespardini.com.br/coronavirus/politica-de-compra)

Central de relacionamento com o Cliente e Atendimento domiciliar:

(31) 3228-6200

Segunda a sexta-feira: 07h às 19h

Sábado: 7h às 18h

Domingo: 07h às 13h

Whatsapp

Análises clínicas, vacinas, diagnóstico por imagem, consultas médicas e laboratórios conveniados:

(31) 3228-6200

Seg a sex - 8h às 18h

Feriados - 8h às 14h

© 2021, © 2017 Magento Demo Store. All Rights Reserved.

(http://pentagrama.com.br/ecommerce)

PROPOSTA COMERCIAL

Proponente: Ramos Rodrigues Serviços Médicos LTDA ME 305800760001-02

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ-SP

Objeto: Constitui objeto do presente a prestação de serviço em caráter emergencial para realização de teste para detecção de COVID-19 (IGG/IGM) mais a presença do profissional da saúde no dia dos testes nos empregados da **CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ-SP**, nos estagiários e nos funcionários de outros órgãos que prestam serviço para Casa, com fornecimento de toda a infraestrutura necessária à execução dos serviços.

Viabilidade e Vigência: A viabilidade seria a testagem a cada 15 dias e o prazo de vigência do presente ajuste será de 3 (três) meses após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

Preços: A Contratada obriga-se a fornecer o objeto deste contrato sendo **R$4.000,00 por dia de testagem** tendo assim o preço total de **R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**, correspondendo a 120 (cento e vinte testes rápidos) COVID sorologia (IGG/IGM) mais a presença de um profissional para acompanhamento clínico e testagem.

Validade: A presente proposta tem seu prazo de validade estabelecido em 30 (trinta dias), podendo ser prorrogado.

Atenciosamente,

Tremembé 20 de maio de 2021

Ramos Rodrigues Serviços Médicos LTDA ME
CPNPJ305800760001-02

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Tremembé, 20 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Declaramos que para a realização da dispensa de licitação, processo administrativo nº 037/2021, contratação de empresa para elaboração de testes rápidos (antígeno covid19) para os servidores pertencentes a este Legislativo, dispomos de um limite de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) na seguinte dotação orçamentária:

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – Gabinete da Presidência
02.01.01 – Gabinete da Presidência
01.031.0086.2083 – Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais

Por ser verdade firmo a presente.

THALLYTA M. D. DA SILVA
Encarregada do Setor de Contabilidade
(Substituta)

CODIFICAÇÃO	NOME DO CÓDIGO	FUNÇÃO
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Registra as despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, prestados por pessoa jurídica sem vínculo empregatício, tais como: análises clínicas, cirurgias, consultas, ecografias, endoscopias, enfermagem, esterilização, exames de laboratório, raio-x, tomografias, tratamento odontológico, ultrassonografias e afins.

PODER LEGISLATIVO

Analítico da Conta de Despesa

Exercício de 2021

Filtro: Nº da Ficha igual a 9

Ficha: 00009 | Dotação: 02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00

Órgão:	**02 - PODER LEGISLATIVO**
UO:	**02.01 - Gabinete da Presidência**
UE:	**02.01.01 - Gabinete da Presidência**
Programática:	**01.031.0086.2083 - Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente**
Conta:	**3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**
Recurso:	**01 - Tesouro**

Dotação Orçamentária:	**90.000,00**
Suplementações	**0,00**
Créditos Especiais:	**0,00**
Créditos Extraordinários:	**0,00**
Remanejamento:	**0,00**
Alterações QDD:	**0,00**
Anulações:	**0,00**
Total Autorizado:	**90.000,00**
Contingenciado:	**0,00**

Data	Tipo	Número	Ano	Credor / Histórico	Movimento	Saldo	Contingenciado	Alterações	Pré-Empenhado	Empenhado
01/01/2021	Fixação da despesa - Fixação inicial				90.000,00	90.000,00				
04/01/2021	Empenho - Inicial	00003	2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-9.896,00	80.104,00				9.896,00
15/02/2021	Empenho - Inicial	00065	2021	MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA	-13.500,00	66.604,00				23.396,00
29/03/2021	Empenho - Inicial	00130	2021	NATAN CAVALCA DINIZ 37739843830	-80,00	66.524,00				23.476,00
10/05/2021	Empenho - Inicial	00173	2021	NATAN CAVALCA DINIZ 37739843830	-80,00	66.444,00				23.556,00
11/05/2021	Empenho - Inicial	00175	2021	NATAN CAVALCA DINIZ 37739843830	-40,00	66.404,00				23.596,00

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 14.065, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da administração pública; adequa os limites de dispensa de licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Ver mais...

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 º A administração pública dos entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos fica autorizada a:

I - dispensar a licitação de que tratam os incisos I e II do **caput** do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), para obras e serviços de engenharia, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente; e

b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para outros serviços e compras, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou de compra de maior vulto, que possam ser realizados de uma só vez;

II - promover o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos, desde que:

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou

b) propicie significativa economia de recursos; e

III - aplicar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do **caput** deste artigo, a Administração deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e

II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto, atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, a Administração deverá prever cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor remanescente;

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de até 30% (trinta por cento) do valor do objeto;

III - a emissão de título de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da Administração; ou

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 3º É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se aos atos realizados durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se aos contratos firmados no período de que trata o **caput** deste artigo independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações.

Art. 3º O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, às escolas de que trata o art. 77 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e às entidades qualificadas como organizações sociais, na forma da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, como organizações da sociedade civil de interesse público, na forma da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, como pontos ou pontões de cultura, na forma da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, ou como organizações da sociedade civil, na forma da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, relativamente aos recursos públicos por elas administrados em decorrência dos respectivos contratos de gestão, termos de parceria, termos de compromisso cultural, termos de colaboração, termos de fomento ou contrato equivalente.

Art. 4º Todos os atos decorrentes desta Lei serão disponibilizados em sítio oficial da internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do contratado, o número de sua inscrição na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação.

Art. 5º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4º .....

.....

§ 2º . .....

.....

VI - as atas de registros de preços das quais a contratação se origine.

.....

§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o **caput** deste artigo, quando se tratar de compra ou de contratação por mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços, previsto no inciso II do **caput** do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 .

§ 5º Nas situações abrangidas pelo § 4º deste artigo, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços se não houver regulamento que lhe seja especificamente aplicável.

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo entre 2 (dois) e 8 (oito) dias úteis, contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços realizado nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo.

§ 7º O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º-E desta Lei não se aplica a sistema de registro de preços fundamentado nesta Lei.

§ 8º Nas contratações celebradas após 30 (trinta) dias da assinatura da ata de registro de preços, a estimativa de preços será refeita, com o intuito de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 4º-E desta Lei." (NR)

"Art. 4º-G. .....

.....

§ 4º As licitações de que trata o **caput** deste artigo realizadas por meio de sistema de registro de preços serão consideradas compras nacionais e observarão o disposto em regulamento editado pelo Poder Executivo federal, observado o prazo estabelecido no § 6º do art. 4º desta Lei." (NR)

" Art. 4º-J. Os órgãos e entidades da administração pública federal poderão aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal em procedimentos realizados nos termos desta Lei, até o limite, por órgão ou entidade, de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Parágrafo único. As contratações decorrentes das adesões à ata de registro de preços de que trata o **caput** deste artigo não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem."

" Art. 4º-K. Os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas com fundamento nesta Lei.

Parágrafo único. Os tribunais de contas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas desta Lei, inclusive por meio de respostas a consultas."

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de setembro de 2020; 199 º da Independência e 132 º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.10 de 2020

TERMO DE VISTORIA
Processo nº 037/2021

Esclareço que se trata de processo de iniciativa do Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé-SP, versando sobre "Processo Administrativo para aplicação de teste Covid19".

Como é cediço o **princípio da licitação é de matriz constitucional** (artigo 37, XXI, da Constituição Federal), conforme demonstra o texto abaixo:

Assim, constata-se que via de regra temos que realizar o **regular certame licitatório**, de modo a assegurar, de um lado, a **isonomia** entre aqueles que desejem contratar com o Estado ou entes de sua administração indireta, e, de outro, a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração Pública.

Sem prejuízo desta disposição, o próprio preceito constitucional reconhece, admite hipóteses em que o procedimento licitatório será **dispensável ou mesmo de realização impossível**. Tais hipóteses devem estar previstas em **lei nacional**, uma vez que, por força do **artigo 22, XXVII, da Constituição Federal**, **compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas direta e indireta de todos os entes da Federação**.

Nesse toar a legislação traz em seu bojo, as hipóteses em que a administração **poderá abrir mão do certame licitatório**.

No caso em tela constata-se que o valor apresentado, encontra-se dentro do patamar de dispensa, havendo ampla pesquisa de preços, conforme demonstram os documentos anexos neste expediente de dispensa de licitação, com a finalidade de justificar o valor, **devendo ser contratado a de menor preço.**

Igualmente, o documento de fls., declara que existe dotação orçamentária e numerário para a contratação.

Atente-se a Chefe de Setor de Compras e Licitações, para o efetivo controle de compras, a fim de se evitar o "ilegal fracionamento".

Paulo Boselli *apud* Jacoby: *"Para que a situação possa implicar na dispensa de licitação deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal preenchendo todos os requisitos.* ***Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador****, encontrando-se as hipóteses de licitação dispensável prevista expressamente na Lei, numerus clausus, no jargão jurídico, querendo significar que são apenas aquelas hipóteses que o legislador expressamente indicou que comportam dispensa de licitação".(* BOSELI, Paulo José Braga, *"Como ter sucesso nas licitações"*, Ed. Edicta, 1998. p. 89)

Contudo, a análise da Procuradoria é estritamente jurídica. O Procurador não tem competência técnica para analisar o acerto das especificações técnicas do objeto da licitação ou do contrato, se o preço de referência está de acordo com o praticado no mercado, bem como se há conveniência ou oportunidade, em razão desses temas escaparem da área de atuação jurídica desse profissional. A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração.

CONCLUSÃO:

Consoante determinação legal, **declaro que analisei os presentes autos, e nada identifiquei que contrarie aos regramentos jurídicos da matéria**.

É o parecer, s.m.j.

Tremembé, 20 de maio de 2021.

Robson Cardoso
Procurador Jurídico
OAB/SP nº 180.244

RECEBEMOS DE (DROGARIA SAO PAULO SA (VD313)) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUN DA ESTANC TURIST DE TREMEMBE	PEDIDO DE VENDA 000.012.593	E:61.412.110/0262-00 D:51.639.391/0001-20 **Nº 000.012.593** SÉRIE 1

DROGARIA SAO PAULO SA
(VD313)

Drogaria SãoPaulo

R FRANCISCO BARRETO LEME, 811, SN -
AREAO - TAUBATE - SP
CEP: 12062001
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.593
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4121 1002 6200 5500 1000 0125 9312 3625 8351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210563127681 21/05/2021 14:53:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
688284005117		61.412.110/0262-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
CAMARA MUN DA ESTANC TURIST DE TREMEMBE			51.639.391/0001-20	21/05/2021 14:52:57
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R SENHOR BOM JESUS,145, sn -	CENTRO		12120000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TREMEMBE		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOT. PIS	VALOR TOT. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
721450	PANBIO COVID TEST AG Lote: HGV321 Qtd: 3.000 Fab: 30/01/2020 Val: 30/01/2023 PMC:	30021590	690	5929	UN	3,00	109,90	329,70	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi o valor de R$ 329,70
Luis Eduardo Sales de Medeiros.

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico - CRF: 68486

21/05/21

Atesto o recebimento de(s) mercadoria(s) constante(s) do Livro Fiscal nº 12593 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
21 / 05 / 21

61.412.110/0262-00
DROGARIA SÃO PAULO S/A
Rua Francisco Barreto Leme, 811
Areão - CEP: 12062-001
TAUBATÉ - SP

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPOM FISCAL : 55005 EMITIDO EM 21/05/2021.	



RECEBEMOS DE 3460 PEIXOTO SA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NFC-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2021 CNPJ: 51.639.391/0262-00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FRANCISCO BARRETO LEME,801,JARDIM,Taubate-SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO		
AUX	UN X VL.ITEM(R$)	TRIB	TOT.ITEM(R$)
001 721450	PENHEIO COUTO TEST AG		
3.000	UN X 109,90	98,51	329,70

Qtde. Total de Items 1
Valor Total R$ 329,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Debito 329,70

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 0561 4121 1002 6200 6503 2000 1660 0519 3723 2695

CONSUMIDOR CNPJ: 51.639.391/0001-20
Numero 000.166.005 Serie 032 Emissao 21/05/2021 14:14:11
Protocolo de autorizacao: 135210482723760
Data de autorizacao: 21/05/2021 14:14:14

Tributos Aprox. R$98,91(30%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT
C. DEBITO
C. DEBITO 01 PARC 476608-6608 AUT:310978 R$ 329,70
DOC:002993098
CNPJ: 51.639.391/0001-20

PDV: 032 NSU 37 OPER 8758600 - OPERADOR AUT 8758600
SUOI 15.00.00/15.51.00 LOJA: 0313

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D	PEDIDO DE VENDA 000.012.591	N° 000.012.591 SÉRIE 1

DROGARIA SAO PAULO SA
(VD313)

Drogaria SãoPaulo

R FRANCISCO BARRETO LEME, 811, SN -
AREAO - TAUBATE - SP
CEP: 12062001
FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.012.591
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4121 1002 6200 5500 1000 0125 9112 3756 9070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

URIEZA DA OPERACAO NDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210559817262 20/05/2021 21:45:23

CRIÇÃO ESTADUAL 284005117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 61.412.110/0262-00

TINATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL MARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D			CNPJ/CPF 51.639.391/0001-20	DATA DA EMISSAO 20/05/2021 21:45:08
EREÇO ntA¿nio LourenA§o Xavier, sn -	BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 12120000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ICÍPIO membA©	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

URA

CUL O IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOT. PIS	VALOR TOT. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

E/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

D. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50	PANBIO COVID TEST AG Lote: 41ADG004A Qtd: 15.000 Fab: 01/01/2021 Val: 01/01/2022 PMC:	30021590	690	5929	UN	15,00	109,90	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi o valor de R$ 1566,00

Diego Anísio R. Da Silva

Dr. Diego Anísio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 60564

20 MAI 2021

Proc nº 027/24
Atesto o recebimento da(s) merca...
constante(s) da Nota Fiscal nº 12591
e a Regularidade Fiscal do For...
20 / 05 / 21

CULO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RENTE CUPOM FISCAL : 54941 EMITIDO EM 20/05/2021.	

NFC-e

DROGARIA SAO PAULO SA CNPJ-61.412.110/0262-00
RUA FRANCISCO BARRETO LEME,811,AREAO,Taubate-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN X VL.ITEM(R$) TRIB	TOT.ITEM(R$)
001 721450 PANBIO COVID TEST AG 15,000 UN X 109,90 469,80	1.648,50
Desconto(-)	-R$ 82,50

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	1.648,50
Descontos R$	-82,50
Valor a Pagar R$	1.566,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	1.566,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 0561 4121 1002 6200 6503 2000 0549 4116 4172 3433

CONSUMIDOR CNPJ: 51.639.391/0001-20 NAO INFORMADO
Numero 000.054.941 Serie 032 Emissao 20/05/2021 20:26:39
Protocolo de autorizacao: 135210261691433
Data de autorizacao: 20/05/2021 20:26:47

Tributos Aprox. R$469,80(30%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT
C. DEBITO R$ 1.566,00
C. DEBITO 01 PARC 516292-6292 AUT:228286
DOC:003884300
NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R$ 82,50
VIVA SAUDE: 250.762.548-14

PDV: 032 NSU 201 OPER 109316 - GABRIELA AUT 109316
SV01 15.00.00/15.51.00 LOJA: 0313

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1817	5	06000061-6	6	AAA	900004	6	R$ 1.566,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Quinhentos e sessenta e seis reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Tabatinga 20 de Maio de 20 21

CÂMARA

TREMEMBE
PRACA GERALDO COSTA. 10
TREMEMBE SP-SP
CONFECÇÃO: 12/2019

CAMARA MUNICIPAL EST TURISTICA
CNPJ 51.639.391/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2015

900004 018 104 1817 5 06000061-6 6 AAA 900004 6

JJ 1817000063772-7

REF. NF Nº 12.591
EMISSÃO 20/05/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2021

99 144. 1953

A. Bom Jesus, 145

Centro - Tabatinga

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANO DOS SANTOS
Sexo: **Masculino** | Idade: **50 anos** | Nascimento: **09/11/1970** | E-mail:
Telefone: **(12) 98152-7588** | Atendimento: **20/05/2021 20:23**
Endereço: **RUA PEDRO CELETE, 831 JARDIM DOS EUCALIPTOS - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 098.701.508-70

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO
SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**

Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA
Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

ADRIANO DOS SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003004
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.

Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **08/12/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99113-7515** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 20:54**
Endereço: **RUA CEL ANTONIO M PATTO, 123, JARDIM BOM JESUS - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 345.316.838-03

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adg004a VALIDADE: 01/2022	Registro MS: 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anísio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF [illegible]

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002059** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **08/12/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99113-7515** | Atendimento: **20/05/2021 20:54**
Endereço: **RUA CEL ANTONIO M PATTO, 123, JARDIM BOM JESUS - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 345.316.838-03

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO

SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**

Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Dr. Diego Anísio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003008
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** Nascimento: **08/12/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99113-7515** | Data do Atendimento: **24/05/2021 - 14:27**
Endereço: **r. CORONEL ANTONIO MONTEIRO PATTO, 123, JD BOM JESUS - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 345.316.838-03

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Declaro que recebi as orientações referentes a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002197** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **08/12/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99113-7515** | Data do Atendimento: **29/05/2021 - 12:40**
Endereço: **Rua Francisco Barreto Leme, 811, Vila São Geraldo - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-000**

CPF: 345.316.838-03

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias	
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvirus humano (HSV) 1; Herpesvirus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002449** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo* *Laudo retificado durante o atendimento.*

Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
Sexo: **Feminino** | Idade: **23 anos** Nascimento: **28/04/1998** | E-mail:
Telefone: **(12) 99211-9272** | Data do Atendimento: **21/05/2021 - 14:42**
Endereço: **R APARECIDA, 125, NOSSA SENHORA GLORIA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 464.226.208-37

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvirus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002086** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
Sexo: **Feminino** | Idade: **23 anos** | Nascimento: **28/04/1998** | E-mail:
Telefone: **(12) 99211-9272** | Data do Atendimento: **21/05/2021 - 14:42**
Endereço: **R APARECIDA, 125, NOSSA SENHORA GLORIA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 464.226.208-37

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adf503a VALIDADE: 12/2021	Registro MS: 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
Declaro que recebi as orientações referentes a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-002086** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Sexo: **Feminino** | Idade: **46 anos** | Nascimento: **01/12/1974** | E-mail:
Telefone: **(12) 99108-6341** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 21:49**
Endereço: **rua antonio nagarotto, 136, JARDIM ANA CANDIDA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 250.673.868-19

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-002065** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Sexo: **Feminino** | Idade: **46 anos** | Nascimento: **01/12/1974** | E-mail:
Telefone: **(12) 99108-6341** | Atendimento: **20/05/2021 21:49**
Endereço: **rua antonio nagarotto, 136, JARDIM ANA CANDIDA - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 250.673.868-19

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO
SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**

Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anísio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003014
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.

Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANO ARLEI DE CARVALHO
Sexo: **Masculino** | Idade: **44 anos** | Nascimento: **28/08/1976** | E-mail:
Telefone: **(12) 98260-4812** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 21:14**
Endereço: **Avenida Jorge Salim Mutran, 101, Esplanada Independência - Taubaté - SP** | CEP: **12.040-870**

CPF: 962.181.696-34

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ADRIANO ARLEI DE CARVALHO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464
Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002061** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANO ARLEI DE CARVALHO
Sexo: **Masculino** | Idade: **44 anos** | Nascimento: **28/08/1976** | E-mail:
Telefone: **(12) 98260-4812** | Atendimento: **20/05/2021 21:14**
Endereço: **Avenida Jorge Salim Mutran, 101, Esplanada Independência - Taubaté - SP** | CEP: **12040-870**

CPF: 962.181.696-34

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO
SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO
Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA
DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**
Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA
Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:
- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA
Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anísio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

ADRIANO ARLEI DE CARVALHO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003010
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANO DOS SANTOS
Sexo: **Masculino** | Idade: **50 anos** | Nascimento: **09/11/1970** | E-mail:
Telefone: **(12) 98152-7588** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 20:23**
Endereço: **RUA PEDRO CELETE, 831, JARDIM DOS EUCALIPTOS - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 098.701.508-70

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvirus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ADRIANO DOS SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anísio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002055** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Sexo: **Masculino** | Idade: **19 anos** | Nascimento: **11/07/2001** | E-mail:
Telefone: **(12) 99115-1193** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 21:00**
Endereço: **Rua Bahia, 488, Jardim dos Estados - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-100**

CPF: 506.946.438-82

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Haemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de sangue pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Felipe A. C. Reino

FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anísio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002060** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Sexo: **Masculino** | Idade: **19 anos** | Nascimento: **11/07/2001** | E-mail:
Telefone: **(12) 99115-1193** | Atendimento: **20/05/2021 21:00**
Endereço: **Rua Bahia, 488, Jardim os Estados - Taubaté - SP** | CEP: **12062-100**

CPF: 506.946.438-82

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO
SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**
Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Felipe M. C. Reino

FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACEUTIC.
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003009
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Sexo: **Feminino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **02/03/1987** | E-mail:
Telefone: **(12) 99142-9419** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 20:49**
Endereço: **Avenida Amador Bueno da Veiga, 2020, Jardim dos Estados - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-400**

CPF: 341.507.168-54

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anísio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002058** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Sexo: **Feminino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **02/03/1987** | E-mail:
Telefone: **(12) 99142-9419** | Atendimento: **20/05/2021 20:49**
Endereço: **Avenida Amador Bueno da Veiga, 2020, Jardim dos Estados - Taubaté - SP** | CEP: **12062-400**

CPF: 341.507.168-54

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO
SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**
Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anísio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003007
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Sexo: **Masculino** | Idade: **39 anos** | Nascimento: **02/08/1981** | E-mail:
Telefone: **(12) 99105-2048** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 21:42**
Endereço: **AV 7 DE SETEMBRO, 588, JARDIM SANTANA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 297.614.788-40

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Fernanda Alcantara

JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002064** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Sexo: **Masculino** | Idade: **39 anos** | Nascimento: **02/08/1981** | E-mail:
Telefone: **(12) 99105-2048** | Atendimento: **20/05/2021 21:42**
Endereço: **AV 7 DE SETEMBRO, 588, JARDIM SANTANA - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 297.614.788-40

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO
SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO
Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA
DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**
Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA
Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:
- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA
Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anisio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003013
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

RENATO VARGAS NETTO
Sexo: **Masculino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **10/09/1986** | E-mail:
Telefone: **(12) 97408-1032** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 21:20**
Endereço: **RUA AUREA AP OLIVEIRA VARGAS, 234, JARDIM ANA CANDIDA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 344.439.558-28

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias. 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvirus humano (HSV) 1; Herpesvirus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

RENATO VARGAS NETTO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002062** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

RENATO VARGAS NETTO
Sexo: **Masculino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **10/09/1986** | E-mail:
Telefone: **(12) 97408-1032** | Atendimento: **20/05/2021 21:20**
Endereço: **RUA AUREA AP OLIVEIRA VARGAS, 234, JARDIM ANA CANDIDA - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 344.439.558-28

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO

SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**

Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Renato Vargas Netto

RENATO VARGAS NETTO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Dr. Diego Anísio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003011
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ROBSON CARDOSO
Sexo: **Masculino** | Idade: **42 anos** | Nascimento: **21/07/1978** | E-mail:
Telefone: **(12) 99144-1953** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 20:29**
Endereço: **RUA ANTONIO NOGARETTO, 114, ANA CANDIDA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 250.762.548-14

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf524a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ati a pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99.99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ROBSON CARDOSO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anísio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464
Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-002056** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ROBSON CARDOSO
Sexo: **Masculino** | Idade: **42 anos** | Nascimento: **21/07/1978** | E-mail:
Telefone: **(12) 99144-1953** | Atendimento: **20/05/2021 20:29**
Endereço: **RUA ANTONIO NOGARETTO, 114, ANA CANDIDA - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 250.762.548-14

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO

SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**

Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACEUTICO
CRF 68464

ROBSON CARDOSO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003005
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

THALYTA M DAIANNA DA SILVA
Sexo: **Feminino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **09/10/1986** | E-mail:
Telefone: **(12) 99136-2757** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 21:54**
Endereço: **RUA TAUBATÉ, 396, PARQUE DAS FONTES - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 229.227.948-73

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

THALYTA M DAIANNA DA SILVA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anísio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-002066** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

THALYTA M DAIANNA DA SILVA
Sexo: **Feminino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **09/10/1986** | E-mail:
Telefone: **(12) 99136-2757** | Atendimento: **20/05/2021 21:54**
Endereço: **RUA TAUBATÉ, 396, PARQUE DAS FONTES - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 229.227.948-73

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO
SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**

Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA
Ministério da Saúde. Disponível em https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anísio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

THALYTA M DAIANNA DA SILVA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003015
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Sexo: **Masculino** | Idade: **30 anos** | Nascimento: **08/07/1990** | E-mail:
Telefone: **(12) 99147-5434** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 20:35**
Endereço: **Rua Engenheiro Urbano Alves de Souza Pereira, 401, Chácara Olaria - Taubaté - SP** | CEP: **12.080-231**

CPF: 402.965.828-83

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf525a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anísio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464
Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-002057** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Sexo: **Masculino** | Idade: **30 anos** | Nascimento: **08/07/1990** | E-mail:
Telefone: **(12) 99147-5434** | Atendimento: **20/05/2021 20:35**
Endereço: **Rua Engenheiro Urbano Alves de Souza Pereira, 401, Chácara Olaria - Taubaté - SP** | CEP: **12080-231**

CPF: 402.965.828-83

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO

SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**
Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anisio Rodrigues da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003006
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

WILSON DIEGO MOREIRA
Sexo: **Masculino** | Idade: **30 anos** | Nascimento: **27/07/1990** | E-mail:
Telefone: **(12) 99105-2959** | Data do Atendimento: **20/05/2021 - 22:00**
Endereço: **RUA ANOTINO LOURENÇO XAVIER, 328, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 355.879.928-37

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PA[illegible]IBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg004a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar contato social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum , Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

WILSON DIEGO MOREIRA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anisio Rodrigues Da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anisio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002067** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anisio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 2674012[illegible]0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Bra[illegible]o, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

WILSON DIEGO MOREIRA
Sexo: **Masculino** | Idade: **30 anos** | Nascimento: **27/07/1990** | E-mail:
Telefone: **(12) 99105-2959** | Atendimento: **20/05/2021 22:00**
Endereço: **RUA ANOTINO LOURENÇO XAVIER, 328, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12120-000**

CPF: 355.879.928-37

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

SEU RESULTADO

SUSPEITO PARA CASO ASSINTOMÁTICO

Sua avaliação o coloca como **suspeito para caso assintomático** para o novo Coronavírus, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Leve este documento ao médico para uma avaliação imediata.

COMO ESTA AVALIAÇÃO FOI FEITA

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS: **20/05/2021**
Paciente com calafrios? **NÃO**
Paciente com dor de garganta? **NÃO**
Paciente com tosse? **NÃO**
Paciente com dor de cabeça? **NÃO**
Paciente com coriza? **NÃO**
Paciente com distúrbios olfativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gustativos? **NÃO**
Paciente com distúrbios gastrointestinais? **NÃO**
Paciente com dispineia ou desconforto respiratório? **NÃO**
Paciente com pressão persistente no tórax(peito)? **NÃO**
Paciente com cianose? **NÃO**
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas em caso confirmado para COVID-19? **SIM**
Se verificada, qual a temperatura do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a oximetria do paciente? **NÃO VERIFICADA**
Se verificada, qual a pressão do paciente? **NÃO VERIFICADA**

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AGORA

Procure atendimento médico imediato para uma avaliação.

Para confirmação, você pode fazer exame no laboratório ou teste rápido para Coronavírus. Converse sobre isso com o profissional que lhe atendeu.

Cuidados que você deve ter agora para prevenção e não propagação:

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilize álcool gel 70% com frequência;
- Utilize máscara, principalmente em lugares públicos;
- Evite contato próximo com outras pessoas, evitando apertos de mão, abraços ou beijos;
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Cubra boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e depois jogue o papel no lixo;
- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;
- Mantenha os ambientes na sua casa ventilados;
- Siga as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde.

REFERÊNCIA

Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus; https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

WILSON DIEGO MOREIRA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Serviço Farmacêutico realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho regional: CRF - 68464 / SP DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a | Nº: DSF-0737-003016
Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.
Documentos gerado por:
Clinicarx - Plataforma Digital de saúde | CNPJ 26740121/0001-63
Acesse os resultados de seus atendimentos de saúde a qualquer momento, em qualquer lugar, baixe o aplicativo Clinicarx.
Disponível para Android e iOS em: https://clinicarx.com.br/app ou use o código ao lado para baixar.
* Seus dados pessoais são tratados para a estrita execução dos serviços de saúde realizados e em conformidade com a Lei n.o 13.709/2018, podendo este documento ser armazenado pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

REBECCA GOULART DE TOLEDO
Sexo: **Feminino** | Idade: **23 anos** | Nascimento: **29/04/1998** | E-mail: **BECCAGOULARTT@GMAIL.COM**
Telefone: **(12) 98805-0170** | Data do Atendimento: **21/05/2021 - 14:44**
Endereço: **Rua Taubaté, 180, Quiririm - Taubaté - SP** | CEP: **12.043-260**

CPF: 496.204.968-25

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ati a pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

REBECCA GOULART DE TOLEDO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-002087** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaRx

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

VICTOR CARVALHO DE ABREU
Sexo: **Masculino** | Idade: **27 anos** | Nascimento: **19/11/1993** | E-mail:
Telefone: **(12) 99171-6116** | Data do Atendimento: **21/05/2021 - 14:47**
Endereço: **AV TREMEMBE, 60, PQ NOSSA SENHORA GLORIA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 357.391.888-30

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PA..BIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99.99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

VICTOR CARVALHO DE ABREU
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-002088** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 2674012 0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Sexo: **Feminino** | Idade: **46 anos** | Nascimento: **01/12/1974** | E-mail:
Telefone: **(12) 99108-6341** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 07:26**
Endereço: **r. antonio nogaroto, 136, ana candida - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 250.673.868-19

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente ere ausência de infecção pelo vírus da COVID- . Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-003169** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

VIVASAÚDE serviços

Declaração de Serviços Farmacêuticos

Nº

Data 14/06/2021

1ª Via Paciente /
2ª Via Drogaria São Paulo

DADOS DO PACIENTE

Nome: Adriana Ardley de Carvalho

Sexo: M Idade: 44 Data nasc. 28/8/1976

E-mail: Telefone:

RG: CPF: 96218169634 Profissional da saúde? ☐ Sim ☒ Não

Endereço: R. Bom Jesus, 145 - Solar da Mantiqueira, Tremembé - SP,

CEP: 12120-000 Cor/Raça: ☐ Preta ☐ Parda ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Indígena

Prescritor:

CRM:

Farmacêutico:

CRF:

Dr. George Alexandre Horada
Farmacêutico - Bioquímico
Habilitado em Homeopatia
CRF-SP: 69.649

Carimbo Farmacêutico Ass. Paciente/Responsável

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19:

Paciente com sintomas de Covid-19? ☐ Sim ☒ Não Data de início dos sintomas: ___/___/___

Paciente com febre? ☐ Sim ☒ Não Temperatura medida: ___ Paciente com tosse? ☐ Sim ☒ Não Paciente com coriza ou congestão nasal? ☐ Sim ☒ Não

Paciente com dor de garganta? ☐ Sim ☒ Não Paciente com dificuldade para respirar? ☐ Sim ☒ Não Paciente com pressão persistente no tórax? ☐ Sim ☒ Não

☐ Diabetes ☐ Imunossupressão ☐ Gestante de alto risco ☐ Portador de doenças cromossômicas

☐ Doenças respiratórias crônicas descompensadas ☐ Doenças cardíacas crônicas ☐ Doenças renais crônicas em estágio avançado

RESULTADO DA TRIAGEM CLÍNICA: *(Interpretação)*

☐ **Não Suspeito**

Os sintomas indicam que este não é um caso suspeito do novo coronavírus.
Para confirmação, o paciente deve realizar exame laboratorial ou teste rápido de coronavírus conforme protocolo específico.

☐ **Caso Suspeito de Coronavírus Condizente com Síndrome Gripal (SR)**

☐ **Caso Suspeito de Coronavírus - Condizente com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**

Os sintomas indicam que este pode ser um caso suspeito do novo coronavírus.
Para mais informações, realize o teste rápido do COVID-19, conforme protocolo específico.

INFORMAÇÕES DO TESTE

FABRICANTE: ABBOTT LOTE: 41ADF524A VALIDADE: 01/04/2022

Sabe se o paciente com sintomas [illegible] ☐ Sim ☐ Não

Paciente com dificuldade para respirar? ☐ Sim ☐ Não

☐ Gestante de alto risco

IgM: ☐ Reagente ☐ Não reagente

IgG: ☐ Reagente ☐ Não reagente

O QUE SIGNIFICA O RESULTADO

IgG (reagente) e IgM positivo (reagente):
[illegible]nifica infecção ativa (recente) [illegible] coronavírus. Em caso de sinais de alerta ou grupo de riscos, deve-se procurar um médico imediatamente.

IgG negativo (não reagente) e IgM positivo (reagente):
Significa infecção ativa (recente) pelo coronavírus. Em caso de sinais de alerta ou grupo de risco, deve-se procurar um médico imediatamente.

IgG positivo (reagente) e IgM negativo (não reagente):
Significa infecção recente pelo coronavírus ou memória imunológica. A conduta deve ser conforme seu quadro clínico atual.

IgG negativo (não reagente) e IgM negativo (não reagente):
Significa que não houve infecção por coronavírus ou está dentro da janela imunológica (falso negativo). Dessa forma, ainda não houve a produção suficiente de anticorpos para serem detectados no teste.

Ag ( ) REAGENTE (X) NÃO REAGENTE As orientações acima não tem finalidade diagnóstica e não caracterizam laudo laboratorial ou substituem a consulta médica.

Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento [illegible] com finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.

Paciente
Declaro que recebi as orientações referentes a este atendimento.

Dr. George Alexandre Horada
Farmacêutico - Bioquímico
Habilitado em Homeopatia
CRF-SP: 69.649
Farmacêutico

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ADRIANO DOS SANTOS
Sexo: **Masculino** | Idade: **50 anos** | Nascimento: **09/11/1970** | E-mail:
Telefone: **(12) 98152-7588** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 14:19**
Endereço: **R. PEDRO CELETE, 831, JD EUCALIPTOS - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 098.701.508-70

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente gere ausência de infecção pelo vírus da COVID-. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ADRIANO DOS SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales de Medeiros

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-003195** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria São Paulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **08/12/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99113-7515** | Data do Atendimento: **10/06/2021 - 16:00**
Endereço: **RUA CORONEL ANTONIO MONTEIRO PATTO, 123, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 345.316.838-03

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias	
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf525a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anisio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-003040** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anisio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **08/12/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99113-7515** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 14:21**
Endereço: **R. CORONEL ANTONIO M PATTO, 123, JD BOM JESUS - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 345.316.838-03

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003196** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Sexo: **Masculino** | Idade: **19 anos** | Nascimento: **11/07/2001** | E-mail:
Telefone: **(12) 99115-1193** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 10:40**
Endereço: **Rua Bahia, 488, Jardim dos Estados - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-100**

CPF: 506.946.438-82

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco	
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Felipe Ap. de C. Reino
FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico CRF 68486
Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-003185** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Sexo: **Masculino** | Idade: **19 anos** | Nascimento: **11/07/2001** | E-mail:
Telefone: **(12) 99115-1193** | Data do Atendimento: **10/06/2021 - 15:30**
Endereço: **Rua Bahia, 488, Jardim dos Estados - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-100**

CPF: 506.946.438-82

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf525a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente gere ausência de infecção pelo vírus da COVID-. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Felipe Ap. De C. Reino
FELIPE APARECIDO DE CASTRO REINO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anisio R. da Sil.
FARMACÊUTICO
CRF 68464
Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003036** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria São Paulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Sexo: **Feminino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **02/03/1987** | E-mail:
Telefone: **(12) 99142-9419** | Data do Atendimento: **10/06/2021 - 12:23**
Endereço: **Rua Francisco Barreto Leme, 811, Vila São Geraldo - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-000**

CPF: 341.507.168-54

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
REAGENTE (POSITIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Gliimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

George Alexandre Harada
Conselho Regional: CRF - 69649 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003016** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
George Alexandre Harada | Farmacêutico | Conselho Regional: CRF - 69649 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/A
R Francisco Ramero Lerrie, 811, 811, Areao - Taubaté - SP | CEP: 12062001
Telefone: (12)3679-9727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

GABRIEL GONCALVES REZENDE
Sexo: Masculino | Idade: 22 anos | Nascimento: 29/05/1999 | E-mail:
Telefone: (12) 98241-6027 | Data do Atendimento: 14/08/2021 - 07:38
Endereço: av marginal 2, 14, Itaivira - Tremembé - SP | CEP: 12.120-000

CPF: 483.938.548-30

CORONAVIRUS ANTIGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVIRUS - ANTIGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)

NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	Indicação para realização do teste rapido COVID-19 Antigeno: Pacientes assintomáticos (com exposição de risco)
EQUIPAMENTO: Cassete	METODO: Imunocromatografico
LOTE: 41405018 VALIDADE: 12/2021	Registro MS: 10071710015

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavirus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavirus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso. Esse é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias: 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Enterovirus 7; Enterovirus 11; Herpesvirus humano (HHV) 1; Herpesvirus humano (HSV) 2; Virus da caxumba Ag; Virus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Virus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Virus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Virus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Virus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Virus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp.(Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum. Interferentes: Excesso de tarcisio pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Ictericia (bilirrubina); FR; Ac antinucleo; Gravida; Guaiacol glyceril eter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Gemfibrozila; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

GABRIEL GONCALVES REZENDE
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003170** valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicar.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros |FARMACEUTICO |Conselho Regional: CRF - 68486 / SP |DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicar Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740123/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82920-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicar.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus acendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: https://clinicar.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria São Paulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
Sexo: **Feminino** | Idade: **23 anos** | Nascimento: **28/04/1998** | E-mail:
Telefone: **(12) 99211-9272** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 09:50**
Endereço: **R. APARECIDA, 125, PQ NOSSA SENHORA GLORIA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 464.226.208-37

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico - CRF: 68486

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-003181** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Sexo: **Masculino** | Idade: **39 anos** | Nascimento: **02/08/1981** | E-mail:
Telefone: **(12) 99105-2048** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 09:21**
Endereço: **AV 07 JANEIRO, 588, SANTANA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 297.614.788-40

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antigenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico - CRF: 68486

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003177** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Sexo: **Masculino** | Idade: **53 anos** | Nascimento: **07/10/1967** | E-mail:
Telefone: **(12) 99715-4792** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 10:16**
Endereço: **R. DOS DIAMANTES, 915, ELDORADO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 623.100.546-15

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco	
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021
		Registro MS: 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico - CRF: 68486

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003183** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria
SãoPaulo

MARIA DE FATIMA LEITE SANTOS

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARÍNGE/OROFARÍNGE)

CORONAVIRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RAPIDO)

NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe | Indicação para realização do teste rapido COVID-19 Antigeno: Pacientes assintomáticos com exposição de risco

EQUIPAMENTO: Cassete | METODO: Imunocromatografico | LOTE: 41ar9501a VALIDADE: 12/2021 | Registro MS 10071730915

COMO INTERPRETAR
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO
COVID-19 (Coronavírus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada que transmite o vírus por meio de gotas expelidas quando ela tosse ou espirra. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais suscetíveis a quadros graves.

Orientações do paciente
O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior desta bula.
Este teste identificou uma infecção ativa e isso ajuda o médico no seu tratamento. Um resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico. Amostras não reagentes em indivíduos com sintomas e sinais clínicos de paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer caso na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer por diversos motivos, como coleta ou armazenamento inadequado da amostra, quantidade de antígeno viral presente abaixo do limite de detecção do teste, ou mutações no vírus. Portanto, um resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico. Amostras não reagentes em indivíduos com sintomas e sinais clínicos de paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer caso na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional CRF - [illegible] / SP
Drogaria São Paulo S/A

MARIA DE FATIMA LEITE SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/SP - 2678?

Laudo Nº: 114-0821-4717-883182 valido e acessar a segunda via deste laudo em https://clinicar.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 56888 / SP | DROGARIA SÃO PAULO S/A - Drogaria São Paulo S/A

Laboratório Clínico
Clinicar Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 181 - Curitiba - PR - CEP 82520-206
Inscrição CRF/PR: 26520 - Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 9829637
Em caso de dúvidas entre em contato com a gestão clínica de saúde que lhe atendeu ou acesse nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde exclusivos a qualquer momento em qualquer lugar. Se tiver em https://clinicar.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não substitui a consulta médica, sendo realizado por profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

NATALIA DE CAMARGO LAZARINI
Sexo: **Feminino** | Idade: **36 anos** | Nascimento: **05/09/1984** | E-mail:
Telefone: **(12) 97403-4666** | Data do Atendimento: **11/06/2021 - 08:07**
Endereço: **R RODRIGUES ALVES, 7, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 318.103.278-65

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

NATALIA DE CAMARGO LAZARINI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003062** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

NATALIA DE CAMARGO LAZARINI
Sexo: **Feminino** | Idade: **36 anos** | Nascimento: **05/09/1984** | E-mail:
Telefone: **(12) 97403-4666** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 11:16**
Endereço: **R. RODRIGUES ALVES, 7, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 318.103.278-65

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

NATALIA DE CAMARGO LAZARINI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003188** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

NATALIA DE CAMARGO LAZARINI
Sexo: **Feminino** | Idade: **36 anos** | Nascimento: **05/09/1984** | E-mail:
Telefone: **(12) 97403-4666** | Data do Atendimento: **14/07/2021 - 13:49**
Endereço: **R RODRIGUES ALVES, 7, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 318.103.278-65

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes à sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico - CRF-SP 68486

NATALIA DE CAMARGO LAZARINI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsável Técnico
CRF/PR - 18206

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003905** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

NATHALIA DE LIMA SOUZA CAMPOS MARTINS
Sexo: **Feminino** | Idade: **20 anos** | Nascimento: **22/05/2001** | E-mail:
Telefone: **(12) 99192-5205** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 09:24**
Endereço: **R. 01 JANEIRO, 144, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 504.109.348-28

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

NATHALIA DE LIMA SOUZA CAMPOS MARTINS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003178** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **26/10/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99208-6488** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 08:08**
Endereço: **r. ernesto narezi, 660, padre eterno - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 374.975.258-32

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico
Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003172** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

REBECCA GOULART DE TOLEDO
Sexo: **Feminino** | Idade: **23 anos** | Nascimento: **29/04/1998** | E-mail: **BECCAGOULARTT@GMAIL.COM**
Telefone: **(12) 98805-0170** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 08:15**
Endereço: **R. TAUBATE, 180, QUIRIRIM - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 496.204.968-25

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico - CRF: 6848

REBECCA GOULART DE TOLEDO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003174** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

VIVASAÚDE serviços

Declaração de Serviços Farmacêuticos

Nº

Data 14/06/2021

1ª Via Paciente /
2ª Via Drogaria São Paulo

DADOS DO PACIENTE

Nome: Renato Vargas Neto

Sexo: M Idade: 34 Data nasc. 10/3/86

E-mail: Telefone:

RG: CPF: 34443235820 Profissional da saúde? ☐ Sim ☒ Não

Endereço: R. Bom Jesus, 145 - Solar da Mantiqueira, Tremembé - SP,

CEP: 12120-000 Cor/Raça: ☐ Preta ☐ Parda ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Indígena

Prescritor:

CRM:

Farmacêutico:

CRF:

Dr. George Alexandre Harada
Farmacêutico · Bioquímico
Habilitado em Homeopatia
CRF-SP: 69.649

Assinatura do Farmacêutico Ass. Paciente/Responsável

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19:

Paciente com sintomas de Covid-19? ☐ Sim ☐ Não Data de início dos sintomas: ___/___/___

Paciente com febre? ☐ Sim ☒ Não Temperatura medida: ___ Paciente com tosse? ☐ Sim ☐ Não Paciente com coriza ou congestão nasal? ☐ Sim ☐ Não

Paciente com dor de garganta? ☐ Sim ☒ Não Paciente com dificuldade para respirar? ☐ Sim ☐ Não Paciente com pressão persistente no tórax? ☐ Sim ☐ Não

☐ Diabetes ☐ Imunossupressão ☐ Gestante de alto risco ☐ Portador de doenças cromossômicas

☐ Doenças respiratórias crônicas descompensadas ☐ Doenças cardíacas crônicas ☐ Doenças renais crônicas em estágio avançado

RESULTADO DA TRIAGEM CLÍNICA: *(Interpretação)*

☐ Não Suspeito

Os sintomas indicam que este não é um caso suspeito do novo coronavírus. Para confirmação, o paciente deve realizar exame laboratorial ou teste rápido do coronavírus conforme protocolo específico.

☐ Caso Suspeito de Coronavírus Condizente com Síndrome Gripal (SR)

☐ Caso Suspeito de Coronavírus - Condizente com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Os sintomas indicam que este pode ser um caso suspeito do novo coronavírus. Para mais informações, realize o teste rápido do COVID-19, conforme protocolo específico.

INFORMAÇÕES DO TESTE

FABRICANTE: ABBOTT LOTE: 41ADF524A VALIDADE: 01/04/2022

☐ Gestante de alto risco

IgM: ☐ Reagente ☐ Não reagente

IgG: ☐ Reagente ☐ Não reagente

O QUE SIGNIFICA O RESULTADO

IgG (reagente) IgM positivo (reagente):
nifica infecção ativa (recente) pelo coronavírus. Em caso de sinais de alerta ou grupo de riscos, deve-se procurar um médico imediatamente.

IgG negativo (não reagente) e IgM positivo (reagente):
Significa infecção ativa (recente) pelo coronavírus. Em caso de sinais de alerta ou grupo de risco, deve-se procurar um médico imediatamente.

IgG positivo (reagente) e IgM negativo (não reagente):
Significa infecção recente pelo coronavírus ou memória imunológica. A conduta deve ser conforme seu quadro clínico atual.

IgG negativo (não reagente) e IgM negativo (não reagente):
Significa que não houve infecção por coronavírus ou está dentro da janela imunológica (falso negativo). Dessa forma, ainda não houve a produção suficiente de anticorpos para serem detectados no teste.

Ag ( ) REAGENTE (X) NÃO REAGENTE As orientações acima não tem finalidade diagnóstica e não caracterizam laudo laboratorial ou substituem a consulta médica.

Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento não tem finalidade diagnóstica e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.

Paciente
Declaro que recebi as orientações referentes a este atendimento.

Farmacêutico

Dr. George Alexandre Harada
Farmacêutico · Bioquímico
Habilitado em Homeopatia
CRF-SP: 69.649

drogariasaopaulo.com.br
4003-3392

Drogaria SãoPaulo

VIVASAÚDE serviços

Declaração de Serviços Farmacêuticos

Nº

Data 14/06/2021

1ª Via Paciente /
2ª Via Drogaria São Paulo

DADOS DO PACIENTE

Nome: Ricardo Alexandre de Toledo

Sexo: M Idade: 45 Data nasc.: 24 / 4 / 76

E-mail: Telefone:

RG: CPF: 264834308 33 Profissional da saúde? Sim 8 Não

Endereço: R. Bom Jesus, 145 - Solar da Mantiqueira, Tremembé - SP,

CEP: 12120-000 Cor/Raça: Preta Parda Branca Amarela Indígena

Prescritor:

CRM:

Farmacêutico:

CRF:

Dr. George Alexandre Harada
Farmacêutico - Bioquímico
Habilitado em Homeopatia
CRF-SP: 69.649

Carimbo Farmacêutico

Ass. Paciente/Responsável

TRIAGEM CLÍNICA COVID-19

Paciente com sintomas de Covid-19? Sim Não

Data de início dos sintomas: ___/___/___

Paciente com febre? Sim Não Temperatura medida: ____

Paciente com tosse? Sim Não

Paciente com coriza ou congestão nasal? Sim Não

Paciente com dor de garganta? Sim Não

Paciente com dificuldade para respirar? Sim Não

Paciente com pressão persistente no tórax? Sim Não

Diabetes Imunossupressão Gestante de alto risco Portador de doenças cromossômicas

Doenças respiratórias crônicas descompensadas Doenças cardíacas crônicas Doenças renais crônicas em estágio avançado

RESULTADO DA TRIAGEM CLÍNICA: *(Interpretação)*

Não Suspeito

Os sintomas indicam que este não é um caso suspeito do novo coronavírus.
Para confirmação, o paciente deve realizar exame laboratorial ou teste rápido de coronavírus conforme protocolo específico.

Caso Suspeito de Coronavírus Condizente com Síndrome Gripal (SR)

Caso Suspeito de Coronavírus - Condizente com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Os sintomas indicam que este pode ser um caso suspeito do novo coronavírus.
Para mais informações, realize o teste rápido do COVID-19, conforme protocolo específico.

INFORMAÇÕES DO TESTE

Gestante de alto risco

IgM: Reagente Não reagente

IgG: Reagente Não reagente

FABRICANTE: ABBOTT LOTE: 41ADF524A VALIDADE: 01/04/2022

Ag ( ) REAGENTE (X) NÃO REAGENTE

O QUE SIGNIFICA O RESULTADO

IgG (reagente) IgM positivo (reagente):
nifica infecção ativa (recente) pelo coronavírus. Em caso de sinais de alerta ou grupo de riscos, deve-se procurar um médico imediatamente.

IgG negativo (não reagente) e IgM positivo (reagente):
Significa infecção ativa (recente) pelo coronavírus. Em caso de sinais de alerta ou grupo de risco, deve-se procurar um médico imediatamente.

IgG positivo (reagente) e IgM negativo (não reagente):
Significa infecção recente pelo coronavírus ou memória imunológica. A conduta deve ser conforme seu quadro clínico atual.

IgG negativo (não reagente) e IgM negativo (não reagente):
Significa que não houve infecção por coronavírus ou está dentro da janela imunológica (falso negativo). Dessa forma, ainda não houve a produção suficiente de anticorpos para serem detectados no teste.

As orientações acima não tem finalidade diagnóstica e não caracterizam laudo laboratorial ou substituem a consulta médica.

Serviço realizado em conformidade à Lei Federal 13.021/2014. Este procedimento [illegible] diagnóstico e não substitui consulta médica ou realização de exames laboratoriais. Conforme Art. 69 RDC 44/09 da Anvisa.

Dr. George Alexandre Harada
Farmacêutico - Bioquímico
Habilitado em Homeopatia
CRF-SP: 69.649

Paciente

Declaro que recebi as orientações referentes a este atendimento.

Farmacêutico

drogariasaopaulo.com.br

4003-3393

Drogaria SãoPaulo

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ROBSON CARDOSO
Sexo: **Masculino** | Idade: **42 anos** | Nascimento: **21/07/1978** | E-mail:
Telefone: **(12) 99144-1953** | Data do Atendimento: **10/06/2021 - 16:17**
Endereço: **RUA BOM JESUS, 145, CENTRO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 250.762.548-14

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf525a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente ere ausência de infecção pelo vírus da COVID-. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

ROBSON CARDOSO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464
Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-003042** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

THALLYTA M DAIANNA DA SILVA
Sexo: **Feminino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **09/10/1986** | E-mail:
Telefone: **(12) 99136-2757** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 08:13**
Endereço: **R. TAUBATE, 396, PQ FONTES - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 229.227.948-73

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico - CRF- 68486

THALLYTA M DAIANNA DA SILVA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003173** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

VICTOR CARVALHO DE ABREU
Sexo: **Masculino** | Idade: **27 anos** | Nascimento: **19/11/1993** | E-mail:
Telefone: **(12) 99171-6116** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 08:30**
Endereço: **AV TREMEMBE, 60, PQ NOSSA SENHORA GLORIA - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 357.391.888-30

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

VICTOR CARVALHO DE ABREU
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales de Medeiros
Farmacêutico
Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003173** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Sexo: **Masculino** | Idade: **30 anos** | Nascimento: **08/07/1990** | E-mail:
Telefone: **(12) 99147-5434** | Data do Atendimento: **10/06/2021 - 15:46**
Endereço: **Rua Engenheiro Urbano Alves de Souza Pereira, 401, Chácara Olaria - Taubaté - SP** | CEP: **12.080-231**

CPF: 402.965.828-83

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf525a **VALIDADE:** 01/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovírus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Dr. Diego Anisio R. da Silva
FARMACÊUTICO
CRF 68464

Diego Anísio Rodrigues Da Silva
Conselho Regional: CRF - 68464 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-003038** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo

Teste laboratorial remoto realizado por:
Diego Anísio Rodrigues Da Silva | Farmacêutico Substituto | Conselho Regional: CRF - 68464 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Sexo: **Masculino** | Idade: **30 anos** | Nascimento: **08/07/1990** | E-mail:
Telefone: **(12) 99147-5434** | Data do Atendimento: **14/06/2021 - 13:17**
Endereço: **Rua Engenheiro Urbano Alves de Souza Pereira, 401, Chácara Olaria - Taubaté - SP** | CEP: **12.080-231**

CPF: 402.965.828-83

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE/OROFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe Ou Orofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adf503a **VALIDADE:** 12/2021	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas tem apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovirus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvirus humano (HSV) 1; Herpesvirus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Fernanda Alcantara
Responsável Técnico
CRF/PR - 26767

Luis Eduardo Sales De Medeiros
Conselho Regional: CRF - 68486 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-003191** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por:
Luis Eduardo Sales De Medeiros | FARMACEUTICO | Conselho Regional: CRF - 68486 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.
Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Sexo: **Feminino** | Idade: **34 anos** | Nascimento: **02/03/1987** | E-mail:
Telefone: **(12) 99142-9419** | Data do Atendimento: **13/09/2021 - 11:52**
Endereço: **Rua Francisco Barreto Leme, 811, Vila São Geraldo - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-000**

CPF: 341.507.168-54

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASAL)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab Nasal	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adg311a VALIDADE: 03/2022	Registro MS: 10071770918

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com método de referência FDA EUA RT-PCR. Sensibilidade: 98,1%. Especificidade: 99,8%. Percentual de concordância total: 99,4%. Os seguintes microrganismos (exceto a Nucleoproteína Humana do SARS-coronavírus pois o SARS-CoV tem alta homologia) não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Adenovírus Tipo 1; Adenovírus Tipo 5; Adenovirus Tipo 7; Enterovirus (EV68); Echovirus 2; Echovirus 11; Enterovirus D68; Virus Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1); Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus Influenza A (H1N1) Estirpe (A/California/08/2009/pdm09); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza Tipo 2; Parainfluenza Tipo 3; Parainfluenza Tipo 4A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; Rhinovirus A16; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Vírus Nucleoproteína do MERS-CoV; Metapneumovirus Humano(hMPV) 16 Tipo A1; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum; Mycobacterum tuberculosis; Lavado nasal humano agrupado N/A; Streptococcus pyogenes; Mycoplasma pneumoniae. As seguintes 43 substâncias potencialmente interferentes não possuiram reatividade cruzada (concentração vide bula): Mucina; HB; TG; Icterícia; Fatores reumatoides; Anticorpo antinuclear; Grávida; Substância Exógena Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina; Cloreto de Sódio com conservantes; Beclometasona; Dexametasona; Flunisolida; Triancinolona; Budesonida; Mometasona; Fluticasonal; Enxofre; Benzocaína; Mentol; Mupirocina; Tobramicina; Biotina; HAMA.

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsável Técnico
CRF/PR - 18206

George Alexandre Harada
Conselho Regional: CRF - 69649 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-004750** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por: George Alexandre Harada | Farmacêutico | Conselho Regional: CRF - 69649 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **26/10/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99208-6488** | Data do Atendimento: **13/09/2021 - 12:08**
Endereço: **Rua Francisco Barreto Leme, 811, Vila São Geraldo - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-000**

CPF: 374.975.258-32

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASAL)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab Nasal	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adg311a VALIDADE: 03/2022	Registro MS: 10071770918

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-9. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com método de referência FDA EUA RT-PCR. Sensibilidade: 98,1%. Especificidade: 99,8%. Percentual de concordância total: 99,4%. Os seguintes microrganismos (exceto a Nucleoproteína Humana do SARS-coronavírus pois o SARS-CoV tem alta homologia) não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Adenovírus Tipo 1; Adenovírus Tipo 5; Adenovírus Tipo 7; Enterovirus (EV68); Echovirus 2; Echovirus 11; Enterovirus D68; Vírus Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1); Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus Influenza A (H1N1) Estirpe (A/California/08/2009/pdm09); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza Tipo 2; Parainfluenza Tipo 3; Parainfluenza Tipo 4A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; Rhinovirus A16; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Vírus Nucleoproteína do MERS-CoV; Metapneumovirus Humano(hMPV) 16 Tipo A1; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum; Mycobacterum tuberculosis; Lavado nasal humano agrupado N/A; Streptococcus pyogenes; Mycoplasma pneumoniae. As seguintes 43 substâncias potencialmente interferentes não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Mucina; HB; TG; Icterícia; Fatores reumatoides; Anticorpo antinuclear; Grávida; Substância Exógena Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina; Cloreto de Sódio com conservantes; Beclometasona; Dexametasona; Flunisolida; Triancinolona; Budesonida; Mometasona; Fluticasonal; Enxofre; Benzocaína; Mentol; Mupirocina; Tobramicina; Biotina; HAMA.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsável Técnico
CRF/PR - 18206

George Alexandre Harada
Conselho Regional: CRF - 69649 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo N°: **TLR-0021-0737-004754** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por: George Alexandre Harada | Farmacêutico | Conselho Regional: CRF - 69649 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Sexo: **Masculino** | Idade: **32 anos** | Nascimento: **08/12/1988** | E-mail:
Telefone: **(12) 99113-7515** | Data do Atendimento: **13/09/2021 - 12:07**
Endereço: **Rua Francisco Barreto Leme, 811, Vila São Geraldo - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-000**

CPF: 345.316.838-03

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASAL)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NAO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab Nasal	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adg311a VALIDADE: 03/2022	Registro MS: 10071770918

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-9. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com método de referência FDA EUA RT-PCR. Sensibilidade: 98,1%. Especificidade: 99,8%. Percentual de concordância total: 99,4%. Os seguintes microrganismos (exceto a Nucleoproteína Humana do SARS-coronavírus pois o SARS-CoV tem alta homologia) não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Adenovírus Tipo 1; Adenovírus Tipo 5; Adenovírus Tipo 7; Enterovirus (EV68); Echovirus 2; Echovirus 11; Enterovirus D68; Vírus Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1); Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus Influenza A (H1N1) Estirpe (A/California/08/2009/pdm09); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza Tipo 2; Parainfluenza Tipo 3; Parainfluenza Tipo 4A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; Rhinovirus A16; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Vírus Nucleoproteína do MERS-CoV; Metapneumovirus Humano(hMPV) 16 Tipo A1; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum; Mycobacterum tuberculosis; Lavado nasal humano agrupado N/A; Streptococcus pyogenes; Mycoplasma pneumoniae. As seguintes 43 substâncias potencialmente interferentes não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Mucina; HB; TG; Icterícia; Fatores reumatoides; Anticorpo antinuclear; Grávida; Substância Exógena Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina; Cloreto de Sódio com conservantes; Beclometasona; Dexametasona; Flunisolida; Triancinolona; Budesonida; Mometasona; Fluticasonal; Enxofre; Benzocaína; Mentol; Mupirocina; Tobramicina; Biotina; HAMA.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsável Técnico
CRF/PR - 18206

George Alexandre Harada
Conselho Regional: CRF - 69649 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-004753** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por: George Alexandre Harada | Farmacêutico | Conselho Regional: CRF - 69649 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

RENATO VARGAS NETTO
Sexo: **Masculino** | Idade: **35 anos** | Nascimento: **10/09/1986** | E-mail:
Telefone: **(12) 97408-1032** | Data do Atendimento: **13/09/2021 - 12:05**
Endereço: **Rua Francisco Barreto Leme, 811, Vila São Geraldo - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-000**

CPF: 344.439.558-28

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASAL)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab Nasal	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adg311a VALIDADE: 03/2022	Registro MS: 10071770918

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com método de referência FDA EUA RT-PCR. Sensibilidade: 98,1%. Especificidade: 99,8%. Percentual de concordância total: 99,4%. Os seguintes microrganismos (exceto a Nucleoproteína Humana do SARS-coronavírus pois o SARS-CoV tem alta homologia) não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Adenovírus Tipo 1; Adenovírus Tipo 5; Adenovírus Tipo 7; Enterovirus (EV68); Echovirus 2; Echovirus 11; Enterovirus D68; Vírus Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1); Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus Influenza A (H1N1) Estirpe (A/California/08/2009/pdm09); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza Tipo 2; Parainfluenza Tipo 3; Parainfluenza Tipo 4A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; Rhinovirus A16; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Vírus Nucleoproteína do MERS-CoV; Metapneumovirus Humano(hMPV) 16 Tipo A1; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum; Mycobacterum tuberculosis; Lavado nasal humano agrupado N/A; Streptococcus pyogenes; Mycoplasma pneumoniae. As seguintes 43 substâncias potencialmente interferentes não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Mucina; HB; TG; Icterícia; Fatores reumatoides; Anticorpo antinuclear; Grávida; Substância Exógena Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina; Cloreto de Sódio com conservantes; Beclometasona; Dexametasona; Flunisolida; Triancinolona; Budesonida; Mometasona; Fluticasonal; Enxofre; Benzocaína; Mentol; Mupirocina; Tobramicina; Biotina; HAMA.

RENATO VARGAS NETTO
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsável Técnico
CRF/PR - 18206

George Alexandre Harada
Conselho Regional: CRF - 69649 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-004752** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por: George Alexandre Harada | Farmacêutico | Conselho Regional: CRF - 69649 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO
DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Sexo: **Masculino** | Idade: **31 anos** | Nascimento: **08/07/1990** | E-mail:
Telefone: **(12) 99147-5434** | Data do Atendimento: **13/09/2021 - 12:04**
Endereço: **Rua Francisco Barreto Leme, 811, Vila São Geraldo - Taubaté - SP** | CEP: **12.062-000**

CPF: 402.965.828-83

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASAL)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab Nasal	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adg311a VALIDADE: 03/2022	Registro MS: 10071770918

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com método de referência FDA EUA RT-PCR. Sensibilidade: 98,1%. Especificidade: 99,8%. Percentual de concordância total: 99,4%. Os seguintes microrganismos (exceto a Nucleoproteína Humana do SARS-coronavírus pois o SARS-CoV tem alta homologia) não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Adenovírus Tipo 1; Adenovírus Tipo 5; Adenovírus Tipo 7; Enterovirus (EV68); Echovirus 2; Echovirus 11; Enterovirus D68; Virus Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1); Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus Influenza A (H1N1) Estirpe (A/California/08/2009/pdm09); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza Tipo 2; Parainfluenza Tipo 3; Parainfluenza Tipo 4A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; Rhinovirus A16; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Virus Nucleoproteína do MERS-CoV; Metapneumovirus Humano(hMPV) 16 Tipo A1; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum; Mycobacterum tuberculosis; Lavado nasal humano agrupado N/A; Streptococcus pyogenes; Mycoplasma pneumoniae. As seguintes 43 substâncias potencialmente interferentes não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Mucina; HB; TG; Icterícia; Fatores reumatoides; Anticorpo antinuclear; Grávida; Substância Exógena Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina; Cloreto de Sódio com conservantes; Beclometasona; Dexametasona; Flunisolida; Triancinolona; Budesonida; Mometasona; Fluticasonal; Enxofre; Benzocaína; Mentol; Mupirocina; Tobramicina; Biotina; HAMA.

VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsável Técnico
CRF/PR - 18206

George Alexandre Harada
Conselho Regional: CRF - 69649 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-004751** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por: George Alexandre Harada | Farmacêutico | Conselho Regional: CRF - 69649 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

Drogaria SãoPaulo

TESTE LABORATORIAL REMOTO

DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a
R Francisco Barreto Leme, 811, 811, Areao - Taubate - Sp CEP: 12062001
Telefone: (12)3629-3727
CNPJ: 61.412.110/0262-00

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Sexo: **Masculino** | Idade: **53 anos** | Nascimento: **07/10/1967** | E-mail:
Telefone: **(12) 99715-4792** | Data do Atendimento: **20/09/2021 - 21:27**
Endereço: **R. DOS DIAMANTES, 915, ELDORADO - Tremembé - SP** | CEP: **12.120-000**

CPF: 623.100.546-15

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASAL)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab Nasal	Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno: Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 41adg311a VALIDADE: 03/2022	Registro MS: 10071770918

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente gere ausência de infecção pelo vírus da COVID-. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com método de referência FDA EUA RT-PCR. Sensibilidade: 98,1%. Especificidade: 99,8%. Percentual de concordância total: 99,4%. Os seguintes microrganismos (exceto a Nucleoproteína Humana do SARS-coronavírus pois o SARS-CoV tem alta homologia) não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Adenovirus Tipo 1; Adenovírus Tipo 5; Adenovírus Tipo 7; Enterovirus (EV68); Echovirus 2; Echovirus 11; Enterovirus D68; Virus Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1); Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus Influenza A (H1N1) Estirpe (A/California/08/2009/pdm09); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza Tipo 2; Parainfluenza Tipo 3; Parainfluenza Tipo 4A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; Rhinovirus A16; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Vírus Nucleoproteína do MERS-CoV; Metapneumovirus Humano(hMPV) 16 Tipo A1; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum; Mycobacterum tuberculosis; Lavado nasal humano agrupado N/A; Streptococcus pyogenes; Mycoplasma pneumoniae. As seguintes 43 substâncias potencialmente interferentes não possuíram reatividade cruzada (concentração vide bula): Mucina; HB; TG; Icterícia; Fatores reumatoides; Anticorpo antinuclear; Grávida; Substância Exógena Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Acido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina; Cloreto de Sódio com conservantes; Beclometasona; Dexametasona; Flunisolida; Triancinolona; Budesonida; Mometasona; Fluticasonal; Enxofre; Benzocaína; Mentol; Mupirocina; Tobramicina; Biotina; HAMA.

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsável Técnico
CRF/PR - 18206

Glezielen Souza Ferreira
Conselho Regional: CRF - 77329 / SP
Drogaria São Paulo S/a

Laudo Nº: **TLR-0021-0737-004837** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por: Glezielen Souza Ferreira | FARMACÊUTICO SUBSTITUTO | Conselho Regional: CRF - 77329 / SP | DSP SAO GERALDO - Drogaria São Paulo S/a

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR

5 em aberto

Relação dos testes de Covid feitos no dia 14/06/2021

1. **Adriana de Almeida Naresi**
2. **Adriano Arlei de Carvalho**
3. **Adriano dos Santos**
4. **Anderson Aparecido de Godoi**
5. **Felipe Aparecido de Castro Reino**
6. **Gabriel Gonçalves Rezende**
7. **Isabela Gusmão da Conceição**
8. **Jackson Barbosa de Oliveira**
9. **Luiz Eduardo Alvarenga**
10. **Maria de Fatima Leite Santos**
11. **Natalia Camargo Lazarini** (fez outro dia 14/07)
12. **Nathália de Lima Souza Campos Martins**
13. **Paulo Roberto dos Santos Junior**
14. **Rebecca Goulart de Toledo**
15. **Renato Vargas Neto**
16. **Ricardo Alexandre de Toledo**
17. **Thallyta M Daianna da Silva**
18. **Victor Carvalho de Abreu**
19. **Vinicius Monteiro Lhamas**

PODER LEGISLATIVO

Relação de Empenhos

Exercício de 2021

Filtro: - Data do empenho entre 01/01/2021 e 31/12/2021;

Empenho			Credor		Dotação		Valores do exercício		Em liquidação/Liquidação		Ordem de pagamento
Número	Ano	Data	Nome	Documento	Ficha	Elemento	Inicial	Atual	Liquidado	À liquidar	
000181	**2021**	**20/05/2021**	**DROGARIA SAO PAULO S.A.**	**61.412.110/0262-00**	**000009**	**3.3.90.39.50**	**1.566,00**	**1.566,00**	**1.566,00**	**0,00**	**1.566,00**
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Dispensa ou inexigibilidade - S37/2021			Dispensa de Licitação						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
000196	**2021**	**21/05/2021**	**FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS**	**00000000000000000**	**000009**	**3.3.90.39.50**	**500,00**	**329,70**	**329,70**	**0,00**	**329,70**
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Outros/Não aplicável - S37/2021			Outros/Não Aplicável						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
000215	**2021**	**10/06/2021**	**FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS**	**00000000000000000**	**000009**	**3.3.90.39.50**	**3.000,00**	**2.610,00**	**2.610,00**	**0,00**	**2.610,00**
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Outros/Não aplicável - S37/2021			Outros/Não Aplicável						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
000217	**2021**	**15/06/2021**	**FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS**	**00000000000000000**	**000009**	**3.3.90.39.50**	**104,40**	**104,40**	**104,40**	**0,00**	**104,40**
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Dispensa ou inexigibilidade - S37/2021			Dispensa de Licitação						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
000218	**2021**	**15/06/2021**	**FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS**	**00000000000000000**	**000009**	**3.3.90.39.50**	**104,40**	**104,40**	**104,40**	**0,00**	**104,40**
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Dispensa ou inexigibilidade - S37/2021			Dispensa de Licitação						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							

PODER LEGISLATIVO
Relação de Empenhos

Exercício de 2021

Filtro: - Data do empenho entre 01/01/2021 e 31/12/2021;

Empenho			Credor		Dotação		Valores do exercício		Em liquidação/Liquidação		Ordem de pagamento
Número	Ano	Data	Nome	Documento	Ficha	Elemento	Inicial	Atual	Liquidado	À liquidar	
000219	2021	15/06/2021	FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	00000000000000000	000009	3.3.90.39.50	208,80	208,80	208,80	0,00	208,80
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Dispensa ou inexigibilidade - S37/2021			Dispensa de Licitação						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
000220	2021	15/06/2021	FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	00000000000000000	000009	3.3.90.39.50	104,40	104,40	104,40	0,00	104,40
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Dispensa ou inexigibilidade - S37/2021			Dispensa de Licitação						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
000221	2021	15/06/2021	FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	00000000000000000	000009	3.3.90.39.50	109,90	109,90	109,90	0,00	109,90
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Dispensa ou inexigibilidade - S37/2021			Dispensa de Licitação						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
000222	2021	15/06/2021	FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	00000000000000000	000009	3.3.90.39.50	219,80	219,80	219,80	0,00	219,80
Dotação					Fonte de Recurso				Aplicação		
02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					01 - Tesouro				110.0000 - Geral		
Processo			Modalidade		Autorização				Ordenador		
Dispensa ou inexigibilidade - S37/2021			Dispensa de Licitação						ANDERSON APARECIDO DE GODOI		
Pedido de Empenho	Pré-empenho	Centro de Custo		Tipo de Despesa	Repasse Concedido	Contrato	Dívida				
		COVD - PANDEMIA - COVID 19		5 - GERAL							
TOTAL							**5.917,70**	**5.357,40**	**5.357,40**	**0,00**	**5.357,40**

PAPELETE

COFRE TIPO URNA

Data: Hora:

GRUPO DPSP

Filial: 3/3

Valor:

Assinatura:

Dr. George Alexandre Ha...
Farmacêutico Bioquímico
Habilitado em Homeopatia
CRF-SP 69.649

MOD.03